

Activité physique : elle est possible et souhaitable en fonction de vos possibilités.

Alimentation : Aucun aliment n'est formellement contre-indiqué.

Si vous avez des difficultés à manger, plutôt que de faire 3 gros repas par jours, privilégiez les collations ou le grignotage.

Tabac : il peut favoriser la survenue des aphtes.

Alcool : la consommation n'est pas interdite pendant l'intercure à condition qu'elle soit avec modération. Évitez pendant la cure.

Exposition solaire : Il faut se protéger surtout en cas d'ensoleillement important: par le port de chapeaux et de vêtements « couvrants » ou utilisation de crèmes protectrices d'indice solaire 50 +

Conduite automobile : l'acuité visuelle et la concentration peuvent être altérées par la chimiothérapie et les médicaments qui l'accompagnent.

Fièvre : **prenez votre température devant toute sensation de fièvre ou de froid inexplicquée ou en cas de frissons. Si vous avez plus de 38,5 °C : faites une prise de sang (NFS) et informez-en votre médecin ou l'infirmière du pôle anticancéreux oraux le jour même**

Vaccinations : la plupart des vaccinations et rappels sont autorisés, voire recommandés pendant votre chimiothérapie. Les vaccins dits « vivants » sont contre-indiqués (type fièvre jaune,...)

Grossesse : une contraception efficace doit impérativement être utilisée pendant toute la durée de votre chimiothérapie. Prévenez rapidement votre médecin en cas de survenue d'une grossesse

Interactions médicamenteuses : informez votre médecin traitant de votre protocole de chimiothérapie et inversement, informez l'équipe médicale de tout nouveau traitement mis en place par votre médecin traitant. Ne prenez pas, sans avis médical préalable, de médicaments disponibles librement et sans ordonnance, ni de phytothérapie

Présentations et caractéristiques

Deux présentations sont disponibles, sous plaquettes thermoformées :

- Boîte de 60 comprimés ronds dosés à 100 mg : 1272,16 euros
- Boîte de 30 comprimés ovoïdes dosés à 400 mg : 2518,67 euros

Coût du traitement journalier : 84 euros

Conservez ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité, et hors de portée des enfants.

Conseils concernant la prise de ce traitement

- Prendre les comprimés en une ou deux fois, en respectant la dose prescrite, avec un grand verre d'eau, au cours d'un repas, possibilité de diluer les comprimés dans un verre d'eau.
- **En cas d'oubli, ne prenez pas la dose oubliée** et ne doublez pas la dose suivante. Notez cet oubli dans le tableau de suivi et prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant.
- Le Glivec® est un anticancéreux oral. Comme tout médicament il peut avoir des effets indésirables. Il est donc important d'informer votre oncologue sur toutes les maladies que vous avez eues et sur tous les traitements que vous prenez.

En cas de questions ou de problème concernant la prise de ce traitement, n'hésitez pas à joindre l'infirmière du pôle anticancéreux oraux

du lundi au vendredi de 8h30 à 16h au 01 71 97 05 94

(Fax pour bilan biologique : 01 49 28 23 12)

Ou adresser un email à : pole.pao@sat.aphp.fr

Fréquence	Description	Prévention	Traitement
+	Œdème : gonflement des jambes, des paupières	Surélever vos pieds quand vous êtes assis Limiter la consommation de sel Eviter les vêtements serrés Surveiller régulièrement votre poids 2 fois/semaine	Un oedém des paupières est un effet secondaire classique mais sans gravité. Les massages peuvent améliorer ce symptôme Si vous constatez une prise de poids rapide et inattendue, consulter votre médecin traitant et prévenez l'infirmière du pôle oral
	Crampes ou douleurs musculaires	Boire régulièrement Eviter les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants	Prévenez l'infirmière du pôle oral en cas de persistance
	Diarrhée : selles liquides	Eviter le café	Eviter les crudités. Privilégier les féculents, carottes, banane. Bien s'hydrater Prendre les médicaments anti-diarrhéiques si selles liquides ou augmentation du nombre de selles/jour (Lopéramide, Diosmectite, Racécadotril) Si plus de 6 selles/j ou persistance de la diarrhée malgré le traitement : prévenir les infirmières du pôle oral
	Nausées, Vomissements, perte de goût	Manger lentement, fractionner les repas	Médicaments : métopimazine, Métoclopramide Si vomissements : prendre les traitements sous forme lyoc ou en suppositoires 3 fois/j S'hydrater avec du Coca ou des bouillons salés Prévenir l'infirmière du pôle oral si impossibilité de boire ou de manger
	Eruption cutanée, sécheresse cutanée	Utiliser un savon doux et une crème hydratante Eviter l'exposition au soleil ou utiliser des vêtements protecteurs ou une crème écran total	Si survenue de plaque rouge et/ou de boutons : arrêtez le traitement par imatinib et prévenez l'infirmière du pôle oral
	Interactions	Attention : très nombreuses interactions Ne pas consommer de jus de pamplemousse ni de millepertuis	Prévenez votre médecin de votre traitement en cours Prévenez votre oncologue de toute modification de votre traitement habituel